

## MULTI-GYN ACTIGEL È UN TRATTAMENTO PER LA VAGINOSI BATTERICA (VB)

- Riduce odori sgradevoli e perdite
- Ha un effetto lenitivo immediato
- Ottimizza il pH e la flora vaginale
- E' un prodotto naturale

## INDICAZIONI

Donne che soffrono dei fastidiosi sintomi legati alla vaginosi batterica (VB). Multi-Gyn ActiGel è molto efficace per il trattamento della VB e dei disagi correlati come perdite acquose di colore grigiastro, odore sgradevole (tipico di pesce), prurito, irritazioni, sensibilità, arrossamento e dolore.

Questo prodotto non è destinato alle malattie a trasmissione sessuale.

## COME FUNZIONA MULTI-GYN ACTIGEL

Multi-Gyn ActiGel è un prodotto a base del complesso brevettato 2QR. Questo ingrediente naturale di origine vegetale ha la capacità unica di proteggere il tessuto vaginale sensibile dai batteri nocivi in modo sicuro e naturale. Multi-Gyn ActiGel favorisce inoltre il processo di guarigione naturale ripristinando direttamente l'acidità vaginale ottimale (pH). Questo ambiente leggermente acido supporta lo sviluppo dei batteri buoni (lattobacilli), ottimizzando la flora vaginale. È un trattamento delicato e altamente efficace senza effetti collaterali dannosi noti.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Per il trattamento della vaginosi batterica (VB), applicare una quantità abbondante di Multi-Gyn ActiGel all'interno della vagina almeno due volte al giorno per un periodo di almeno 5 giorni. Si consiglia di applicare il prodotto prima di coricarsi.
- Per disturbi vaginali come prurito e irritazioni, applicare una quantità abbondante di Multi-Gyn ActiGel almeno una volta al giorno o ogni volta che si desidera un sollievo.

Multi-Gyn ActiGel non deve essere utilizzato per più di 30 giorni consecutivi. Ciò consente alla flora vaginale di regolarsi senza supporto.

Se i disturbi persistono o si ripresentano, si consiglia di contattare il proprio medico.


## ATTENZIONE

Dopo l'applicazione si potrebbe avvertire una sensazione di bruciore e/o formicolio. Tale sensazione è normale e scompare rapidamente.


## COME USARE MULTI-GYN ACTIGEL ESTERNAMENTE E INTERNAMENTE

### · APPLICAZIONE ESTERNA


In caso di disturbi alla zona intima esterna (la vulva) è possibile applicare Multi-Gyn ActiGel con le dita. Lavare sempre le mani prima di farlo.




1. Togliere il tappo del tubetto. Per il primo utilizzo, utilizzare la parte posteriore del tappo per perforare il sigillo.



2. Tenere il tubetto con una mano e mettere l'indice dell'altra mano vicino al tubetto, come mostrato nella figura. Premere delicatamente il tubetto e tenerlo premuto fino ad avere sull'indice una adeguata quantità di prodotto, come mostrato nella figura.



3. La quantità di gel sull'indice dovrebbe essere almeno pari alla punta del dito (circa 2 ml).



4. Applicare il gel sulla zona intima esterna.

## MULTI-GYN ACTIGEL SI BASA SU INGREDIENTI NATURALI

Multi-Gyn ActiGel è un prodotto naturale, basato sul complesso 2QR. Non ha profumo ed è privo di ormoni e ingredienti di origine animale.

## INGREDIENTI PRINCIPALI

Acido poligluconico galattoarabico crosspolimero\*, gomma xantana, glicerina, glicole caprilico.

\* Complesso 2QR: ingrediente brevettato purificato da Aloe Barbardensis.

## INFORMAZIONI ALLERGICHE

Le allergie agli ingredienti di Multi-Gyn ActiGel sono molto rare. In caso di dubbi, provare una piccola quantità di prodotto all'interno del braccio. Se compare una macchiolina o una chiazza di colore rosso e pruriginosa, si consiglia di non usare Multi-Gyn ActiGel.

## EFFETTI COLLATERALI

Poiché Multi-Gyn ActiGel ha un'acidità ottimale per la vagina e lo sperma è alcalino, l'uso di Multi-Gyn ActiGel può ridurre l'attività degli spermatozoi. Pertanto, Multi-Gyn ActiGel non deve essere usato durante il periodo di ovulazione quando si desidera una gravidanza. Non esistono altri effetti collaterali noti.

## INTERAZIONI CON I FARMACI

Non esistono interazioni note con i farmaci.

## GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Non esistono controindicazioni note all'uso di Multi-Gyn ActiGel durante la gravidanza e l'allattamento, ma si consiglia di consultarsi con il proprio medico prima di utilizzarlo.

## UTILIZZO CON PRESERVATIVI E PESSARI

Multi-Gyn ActiGel non deve essere usato in concomitanza con i preservativi. L'effetto sui pessari è sconosciuto.

## UTILIZZO CON TAMPONI E LAVAGGI VAGINALI


Si consiglia di non utilizzare Multi-Gyn ActiGel in concomitanza con tamponi e lavaggi vaginali. Essi possono rimuovere (parte di) prodotto Multi-Gyn LiqueGel dalla vagina e possono quindi ridurre l'effetto del prodotto.

## CONSERVAZIONE


Conservare Multi-Gyn ActiGel tra 10 °C e 25 °C (temperatura ambiente). Tenere Multi-Gyn ActiGel fuori dalla portata dei bambini. Non usare Multi-Gyn ActiGel dopo la data di scadenza.

## • APPLICAZIONE INTERNA


Lo speciale applicatore incluso nella confezione può essere utile per applicare il gel all'interno della vagina. L'applicatore deve essere avvitato sul tubetto. Dopo l'uso è possibile lasciare l'applicatore sul tubetto: in tal caso lavarlo con acqua calda e quindi rimettere il cappuccio sull'applicatore. Se si preferisce, è possibile applicare il gel internamente con un dito invece di usare l'applicatore. Lavare le mani e applicare sull'indice una quantità di gel pari almeno alla punta del dito e introdurre il dito nella vagina.




1. Togliere il tappo del tubetto. Per il primo utilizzo, utilizzare la parte posteriore del tappo per perforare il sigillo.




2. Avvitare sul tubetto lo speciale applicatore che si trova all'interno della scatola.




3. Togliere il cappuccio piccolo dall'applicatore.




4. Tenere il tubetto con una mano e premerlo delicatamente fino a far fuoriuscire il gel dall'applicatore. Quando il gel fuoriesce significa che l'applicatore è pieno di gel e pronto per l'uso. Esercitarsi per capire quanto gel fuoriesce con una leggera pressione; la quantità necessaria è pari almeno alla punta di un dito (circa 2 ml).




5. Inserire in vagina l'applicatore, sempre attaccato al tubetto, come mostrato nella figura. L'applicatore è più piccolo della vagina e non danneggerà la cervice (apertura dell'utero).



6. Premere delicatamente il tubetto. La quantità minima necessaria è pari alla punta di un dito. Non vi è alcun rischio se se ne applica una quantità maggiore.



7. Dopo l'uso è possibile lasciare l'applicatore sul tubetto e lavarlo con acqua calda.



8. Rimettere il cappuccio piccolo sull'applicatore.

## INFORMAZIONI DI BASE

Un ambiente vaginale sano ospita un insieme di diversi batteri in equilibrio tra loro: la flora vaginale. Quando l'ambiente naturale o il pH della vagina vengono disturbati, batteri e microbi dannosi possono prosperare. La vaginosi batterica (VB) e le infezioni da lieviti sono molto comuni e i sintomi e i disturbi correlati possono rendere la vita spiacevole. È importante trattare le infezioni non appena possibile, ma può essere difficile identificare i sintomi. I sintomi e i disturbi delle vaginosi batteriche e delle infezioni da lievito sono diversi. Il trattamento efficace inizia comprendendo il problema. Le informazioni seguenti spiegano cosa sono le vaginosi batteriche e le infezioni da lievito e come i sintomi di queste infezioni siano diversi tra loro.

### VAGINOSI BATTERICA

#### Cos'è la vaginosi batterica (VB)?

La vaginosi batterica è dovuta all'eccessiva proliferazione di uno dei numerosi batteri "cattivi" naturalmente presenti nella vagina. Di solito, i batteri "buoni" (lattobacilli) sono più numerosi dei batteri "cattivi". Ma se invece ci sono troppi batteri cattivi, essi alterano il naturale equilibrio dei microrganismi nella vagina e causano la vaginosi batterica.

#### Come si riconosce di avere una VB?

Si potrebbe notare una differenza nelle perdite vaginali, che possono essere più fluide, acquose e trasparenti o di colore grigio e più abbondanti del solito. Se si ha la VB, è probabile che le perdite abbiano uno sgradevole odore di pesce, specialmente dopo un rapporto sessuale

non protetto. Si può anche soffrire di disturbi vaginali come prurito, irritazione, sensibilità, arrossamento e dolore. L'acidità vaginale in questi casi è sempre alterata, con un pH più alcalino superiore a 5. Alcune donne non hanno sintomi, il che rende difficile il riconoscimento della VB.

#### Ha bisogno di essere curata?

La vaginosi batterica non è un'infezione vaginale pericolosa. È tuttavia un grande fastidio e può davvero influenzare la qualità della vita. Quando si soffre di disturbi infettivi, è quindi indicato il trattamento. Il trattamento è particolarmente importante per le donne in gravidanza. Valutare le opzioni disponibili con il proprio medico.

### INFEZIONI DA LIEVITO

#### Che cos'è un'infezione da lievito vaginale?

Un'infezione da lievito vaginale è un'infezione fungina che provoca irritazione, perdite e intenso prurito alla vagina e alla vulva, ovvero ai tessuti dell'apertura vaginale.

#### Come si riconosce di avere un'infezione da lievito?

È comune notare perdite bianche inodori con una consistenza grumosa simile alla ricotta. Si può anche soffrire di altri disturbi vaginali come prurito, irritazione, sensibilità, arrossamento e dolore.

#### Ha bisogno di essere curata?

L'infezione da lievito non è una pericolosa infezione vaginale. È tuttavia un grande fastidio e può davvero influenzare la qualità della vita. Quando si soffre di disturbi infettivi, è quindi indicato il trattamento.